

Calendario de Vacunación 2020

VACUNACIÓN ESCOLAR		
1° Básico	Tres vírica	Sarampión, Rubéola y Parotiditis
	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
4° Básico	VPH - 1ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
5° Básico	VPH - 2ª dosis	Infecciones por Virus Papiloma Humano
8° Básico	dTp (acelular)	Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

Consideraciones Especiales

- La vacunación escolar se realiza durante el segundo semestre de cada año.
- La vacunación se realiza en todos los establecimientos educacionales públicos y privados del país y es ejecutada por el personal de los vacunatorios de los establecimientos de salud de atención primaria (APS).
- Aquellos niños o niñas que por algún motivo no sean vacunados en su establecimiento educacional, podrán acudir a un vacunatorio público o privado en convenio con la SEREMI correspondiente.

Procedimiento para una Vacunación Segura

Vacuna SRP; Entrega protección para tres enfermedades: Sarampión, Rubéola y Parotiditis. (Vacuna SRP)

*La vacuna SRP multidosi del laboratorio Serum Institute of India, NO tiene como contraindicación la alergia al huevo debido a que esta vacuna se obtiene de cultivos de fibroblastos de embriones de pollo, no contiene cantidades importantes de proteínas ovígenas reactivas.

REACCIONES ADVERSAS Las reacciones que puede provocar la vacuna son leves y desaparecen en pocos días.

•Se reportan: fiebre leve (8%), exantema leve (1a2%) que puede aparecer entre los días 5 a 12 posterior a la aplicación de la vacuna. Inflamación de ganglios cervicales y dolores articulares.

Vacuna dTp acelular (dTpa), Protege contra Difteria, Tétanos y Coqueluche.

Vacuna dTp acelular

REACCIONES ADVERSAS: Niños de 4 a 9 años de edad: Muy frecuentes: reacciones en el lugar de inyección (dolor, enrojecimiento e inflamación), fatiga. Frecuentes: Fiebre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (incluida fiebre $> 39^{\circ}\text{C}$). Adultos, adolescentes y niños a partir de 10 años de edad: Muy frecuentes: Reacciones en el lugar de inyección (dolor, enrojecimiento e inflamación), fatiga, malestar general. Frecuentes: Fiebre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$, reacción en el lugar de inyección (induración y absceso estéril en el lugar de inyección).

Vacuna VPH Tetraivalente: Que protege contra infecciones causadas por Virus de Papiloma Humano por los serotipos 6, 11, 16, 18.

Vacuna VPH

REACCIONES ADVERSAS Eritema, dolor, aumento de volumen, prurito y hematoma en el lugar de la inyección, que puede ser leve o moderado. Cefalea, fiebre, artralgia, mialgia, mareos, trastornos gastrointestinales y náuseas, son menos frecuentes. Hipersensibilidad incluyendo reacciones anafilácticas, bronco espasmo y urticaria, son reacciones excepcionales. GARDASIL puede administrarse en forma concomitante con otras vacunas.

Información a los Padres y/o Apoderados

Por tratarse de una medida instruida por Decreto Ministerial, tiene carácter obligatorio y no corresponde aplicar un procedimiento de consentimiento informado.

HORARIO DE VACUNACIÓN

Día 27 de octubre del 2020

1° Básico A Y 8° Básico A	09:00 A 10:00 HRS
1° Básico B	10:00 A 11:00 HRS
1° Básico C	11:00 A 12:00 HRS
8° Básico B	12:00 A 13:00 HRS

Día 28 de octubre del 2020

4° Básico A Y 5° Básico A	09:00 A 10:00 HRS
4° Básico B Y 5° Básico B	10:00 A 11:00 HRS
4° Básico C Y 5° Básico C	11:00 A 12:00 HRS
4° Básico D	12:00 A 13:00 HRS

